PRECAUCIONES:

I. MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS.
II. NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS.
III. INUTILIZAR LOS ENVASES VACIOS PARA EVITAR OTROS USOS.
IV. EN CASO DE INTOXICACION LLEVAR ESTA ETIQUETA AL MEDICO.
V. EL PRESENTE PRODUCTO DEBE SER COMERCIALIZADO Y APLICADO DANDO CUMPLIMIENTO A LAS NORMATIVAS PROVINCIALES Y MUNICIPALES VIGENTES.
VI. PELIGRO. SU USO INCORRECTO PUEDE PROVOCAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE. LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA.

MEDIDAS PRECAUTORIAS GENERALES:

Medidas de protección personal durante la preparación de la mezcla: utilizar guantes y botas de goma, delantal impermeable protector de nariz, boca y facial.
Medidas de protección personal durante la aplicación de la mezcla: utilizar guantes y botas de goma, overol impermeable protector de nariz y boca, protector facial.
Medidas de prevención después de la aplicación: Lavar minuciosamente las partes del cuerpo expuestas al producto luego de aplicar el fungicida biológico, en especial antes de consumir alimentos. Usar ropa especialmente destinada a este trabajo, lavar la misma después de aplicar el producto.

RIESGOS AMBIENTALES:

AVES, producto PRÁCTICAMENTE NO TÓXICO
PECES, producto PRÁCTICAMENTE NO TÓXICO
ABEJAS, producto VIRTUALMENTE NO TÓXICO

TRATAMIENTO DE REMANENTES Y CALDOS DE APLICACIÓN:

Después de la aplicación limpiar las máquinas e implementos utilizados incluyendo los equipos de seguridad utilizados. Pulverizar los remanentes de los caldos que integra y líquidos de lavado de máquinas y envases sobre terrenos, rastrojos no pastoreables o caminos internos.

TRATAMIENTO Y MÉTODO DE DESTRUCCIÓN DE ENVASES VACIOS:

Realizar el triple lavado de los envases vacíos. Luego proceder a perforar los envases para inutilizarlos completamente y entregarlos al centro de reciclado más cercano autorizado por las autoridades zonales.

ALMACENAMIENTO:

Almacenar en envases originales, a la sombra, en lugar seco y ventilado, alejado de intensa luz y/o calor y de productos que puedan emanar vapores tóxicos. Evitar temperaturas superiores a 30° C.

DERRAMES:

En caso de derrames, cubrir lo volcado con material absorbente (tierra, aserrín, etc), barrer prolijamente, recoger el barrido y enviarlo a una empresa especializada para su correcta disposición. Luego, de ser posible, lavar la superficie con agua.

PRIMEROS AUXILIOS:

En caso de ingestión No inducir al vómito. **En caso de contacto con la piel**, lavar las zonas expuestas con abundante agua y jabón. Lavar la ropa contaminada antes de volver a usar. **En caso de contacto con los ojos**, enjuagar con agua limpia durante 15 minutos. **EN TODOS LOS CASOS LLAMAR INMEDIATAMENTE AL MÉDICO.**

ADVERTENCIA PARA EL MÉDICO:

Clase IV: Producto que normalmente no ofrece peligro.
Inhalatoria: Categoría III. (Cuidado) Irritación Cutánea: Leve Irritante (Cuidado) Categoría IV. Irritación Ocular: Leve irritante (Cuidado) Categoría IV. Sensibilización Cutánea: No sensibilizante.
Aplicar tratamiento sintomático.

Síntomas de Intoxicación aguda: NO PRESENTA.

CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIONES:

Centro Toxicológico Hospital Municipal de Niños de Bs. As., Dr. Ricardo Gutiérrez: Tel. 011-4962-2247/6666 Hospital de Clínicas de Bs. As. Gral. San Martín: Tel. 011-5950-8804/6
Centro Nacional de Intoxicaciones Policlínico Posadas (Haedo, Pcia. de Bs. As.): Tel. 011-4654-6648 y 4658- 7777
Centro de Consultas Toxicológicas (TAS) Rosario: Tel 0341-4480077 y 424-2727

FUNGICIDA – TERÁPICO PARA EL TRATAMIENTO DE SEMILLAS

TRICHODERMIL® SC

Suspensión concentrada
Fungicida Biológico

COMPOSICIÓN:

Trichoderma harzianum cepa ESALQ 1306..... 48 g (4.8% p/v) (*)
Aceite vegetal ..... c.s.p. ..... 1 L

(*) contiene 2 x 10^9 conidios/mL al vencimiento.

LEA ÍNTEGRAMENTE ESTA ETIQUETA
ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO

SENASA N° 40.588

CONTENIDO NETO: 1 L

N° de Lote: ver en el envase
Fecha de Vencimiento: ver en el envase

Producto no inflamable

ORIGEN BRASIL

REGISTRADO POR:
KOPPERT ARGENTINA S.A.
Empresa Inscripta en SENASA N° A-00077
Paraguay 535 4° piso Dpto. A
CABA (1057)

FABRICADO POR:
Koppert

REV01-2510-ART.40588.1L

GENERALIDADES DEL PRODUCTO:

TRICHODERMIL SC es un fungicida biológico para el control de organismos patógenos que afectan el cultivo de SOJA y TRIGO, ya que posee diferentes mecanismos de acción (antagonismo, parasitismo y antibiosis). Mejora el stand de plantas logradas a campo, inhibiendo el crecimiento de patógenos, promoviendo el crecimiento vegetal (efecto PGPR) e incrementando la longitud, el volumen y/o el peso seco de las raíces y partes aéreas de las plántulas.

INSTRUCCIONES PARA ELUSO:
PREPARACIÓN:

Aplicarlo directamente a las semillas, según dosis recomendadas.

EQUIPOS, VOLÚMENES Y TÉCNICAS DE APLICACIÓN:

Mezclar el producto con las semillas en la dosis indicada mediante la utilización de máquinas destinadas a tal fin hasta la obtención de una cobertura uniforme.
SOJA: Para preinocular **hasta 45 días antes de la siembra**, realizar una mezcla homogénea de 100 mL del protector (Nitrasoil-L/ Koprotect) + 300 mL de **TRICHODERMIL SC** y aplicar a 100 kg de semilla.
TRIGO: Para preinocular **hasta 45 días antes de la siembra**, realizar una mezcla homogénea de 200 mL del protector (Nitrasoil-L/ Koprotect) + 600 mL de **TRICHODERMIL SC** y aplicar a 100 kg de semilla.

Importante:

- El proceso de inoculación deberá llevarse a cabo en lugares donde no incida la radiación solar directa.
- Para aplicaciones combinadas con productos compatibles seguir el método secuencial seco: aplicar primero los terápicos de base química para el tratamiento de semillas, dejar orear y secar, y por último aplicar los fertilizantes biológicos conjuntamente con **TRICHODERMIL SC.**
- Realizar la calibración de la sembradora con la semilla tratada.

RECOMENDACIONES DE USO:

CULTIVO	Enfermedades controladas	DOSIS cada 100 Kg de semilla
SOJA (*)	*Cercospora kikuchii* *Phomopsis* spp *Fusarium* spp *Rhizoctonia spp* *Sclerotinia sclerotiorum* *Macrophomina phaseolina*	300 mL
TRIGO (*)	*Fusarium graminearum* *Drechslera tritici repentis* *Bipolaris sorokiniana* "Carbón Cubierto" *Tilletia laevis* "Carbón Desnudo" *Ustilago tritici* *Rhizoctonia spp*	600 mL

*En tratamientos de semillas utilizar un protector biológico (Nitrasoil-L/Koprotect), para proporcionar el color a la semilla y aumentar la eficacia del producto.

RESTRICCIONES PARA EL USO:

Periodo de carencia: **TRICHODERMIL SC** se halla exento de período de carencia para el uso como terápico para tratamiento de semillas. En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberá conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.

COMPATIBILIDAD:

TRICHODERMIL SC es compatible con la mayoría de los productos biológicos y fungicidas aplicables a las semillas.

FITOTOXICIDAD:

No se han manifestado síntomas de fitotoxicidad, respetando las dosis y siguiendo las recomendaciones que figuran en esta etiqueta.

AVISO DE CONSULTA TECNICA: "CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO"

GARANTIA:

Este producto se elabora según estrictas normas de calidad. El fabricante sólo es responsable de las características físico-químicas de este producto. Al no ejercer control técnico de su almacenamiento y la aplicación, no se hace responsable por daños y perjuicios que deriven del uso distinto al indicado en esta etiqueta.

CUIDADO

259 (w) x 140 (h) mm
4 colors: BLACK PANTONE 199 C PANTONE 3435 C PANTONE 347 C