

FUNGICIDA – TERÁPICO PARA EL TRATAMIENTO DE SEMILLAS

TRICHODERMIL® SC

Suspensión concentrada
Fungicida Biológico

COMPOSICIÓN:

<i>Trichoderma harzianum</i> cepa ESALQ 1306.....	48 g (4.8% p/v) (*)
Aceite vegetal	c.s.p. 1 L

(*) contiene 2×10^9 conidios/mL al vencimiento.

**LEA ÍNTEGRAMENTE ESTA ETIQUETA
ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO**

SENSASA N° 40.588

N° de Lote: ver en el envase

Fecha de Vencimiento: ver en el envase

Producto no inflamable

ORIGEN BRASIL

CONTENIDO NETO: 5 L

REGISTRADO POR:

KOPPERT ARGENTINA S.A.

Empresa Inscripta en SENASA N° A-00077

Paraguay 535 4° piso Dpto. A

CABA (1057)

FABRICADO POR:

Koppert



CUIDADO

REV00-2507-ART-40588-5L

PRECAUCIONES:

- I. MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS.
- II. NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS.
- III. INUTILIZAR LOS ENVASES VACÍOS PARA EVITAR OTROS USOS.
- IV. EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVAR ESTA ETIQUETA AL MÉDICO.
- V. EL PRESENTE PRODUCTO DEBE SER COMERCIALIZADO Y APLICADO DANDO CUMPLIMIENTO A LAS NORMATIVAS PROVINCIALES Y MUNICIPALES VIGENTES.
- VI. PELIGRO. SU USO INCORRECTO PUEDE PROVOCAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE. LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA.

MEDIDAS PRECAUTORIAS GENERALES:

Medidas de protección personal durante la preparación de la mezcla: utilizar guantes y botas de goma, pantalón impermeable protector de nariz, boca y facial.

Medidas de protección personal durante la aplicación de la mezcla: utilizar guantes y botas de goma, overall impermeable protector de nariz y boca, protector facial.

Medidas de prevención después de la aplicación: Lavar minuciosamente las partes del cuerpo expuestas al producto luego de aplicar el fungicida biológico, en especial antes de consumir alimentos. Usar ropa especialmente destinada a este trabajo, lavar la misma después de aplicar el producto.

RIESGOS AMBIENTALES:

AVES, producto PRÁCTICAMENTE NO TÓXICO

PECES, producto PRÁCTICAMENTE NO TÓXICO

ABEJAS, producto VIRTUALMENTE NO TÓXICO

TRATAMIENTO DE REMANENTES Y CALDOS DE APLICACIÓN:

Después de la aplicación limpiar las máquinas e implementos utilizados incluyendo los equipos de seguridad utilizados. Pulverizar los remanentes de los caldos que integra y líquidos de lavado de máquinas y envases sobre terrenos, rastrojos no pastoreables o caminos intermos.

TRATAMIENTO Y MÉTODO DE DESTRUCCIÓN DE ENVASES VACÍOS:

Realizar el triple lavado de los envases vacíos. Luego proceder a perforar los envases para inutilizarlos completamente y entregarlos al centro de reciclado más cercano autorizado por las autoridades zonales.

ALMACENAMIENTO:

Almacenar en envases originales, a la sombra, en lugar seco y ventilado, alejado de intensa luz y/o calor y de productos que puedan emanar vapores tóxicos. Evitar temperaturas superiores a 30° C.

DERRAMES:

En caso de derrames, cubrir lo volcado con material absorbente (tierra, aserrín, etc.), barrer prolijamente, recoger el barrido y enviarlo a una empresa especializada para su correcta disposición. Luego, de ser posible, lavar la superficie con agua.

PRIMEROS AUXILIOS:

En caso de ingestión No inducir al vómito. **En caso de contacto con la piel,** lavar las zonas expuestas con abundante agua y jabón. **Lavar la ropa contaminada** antes de volver a usar. **En caso de contacto con los ojos,** enjuagar con agua limpia durante 15 minutos. **EN TODOS LOS CASOS LLAMAR INMEDIATAMENTE AL MÉDICO.**

ADVERTENCIA PARA EL MÉDICO:

Clase IV: Producto que normalmente no ofrece peligro.

Inhalatoria: Categoría III. (Cuidado) **Irritación Cutánea:** Leve Irritante (Cuidado) **Categoría IV. Irritación Ocular:** Leve irritante (Cuidado) **Categoría V. Sensibilización Cutánea:** No sensibilizante. **Aplicar tratamiento sintomático.**

Síntomas de intoxicación aguda: **NO PRESENTA.**

CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIONES:

Centro Toxicológico Hospital Municipal de Niños de Bs. As., Dr. Ricardo Gutiérrez: Tel. 011-4962-2247/6666
Hospital de Clínicas de Bs. As. Gral. San Martín: Tel. 011-5950-8804/6

Centro Nacional de Intoxicaciones Polidivicio Posadas (Haedo, Pcia. de Bs. As.): Tel. 011-4654-6648 y 4658-7777
Centro de Consultas Toxicológicas (TAS) Rosario: Tel 0341-4480077 y 424-2727

GENERALIDADES DEL PRODUCTO:

TRICHODERMIL SC es un fungicida biológico para el control de organismos patógenos que afectan el cultivo de SOJA y TRIGO, ya que posee diferentes mecanismos de acción (antagonismo, parasitismo y antibiosis). Mejora el stand de plantas logradas a campo, inhibiendo el crecimiento de patógenos, promoviendo el crecimiento vegetal (efecto PGPR) e incrementando la longitud, el volumen y/o el peso seco de las raíces y partes aéreas de las plántulas.

INSTRUCCIONES PARA EL USO:

PREPARACIÓN:

Aplicarlo directamente a las semillas, según dosis recomendadas.

EQUIPOS, VOLUMENES Y TÉCNICAS DE APLICACIÓN:

Mezclar el producto con las semillas en la dosis indicada mediante la utilización de máquinas destinadas a tal fin hasta la obtención de una cobertura uniforme.

SOJA: Para preinocular hasta 45 días antes de la siembra, realizar una mezcla homogénea de 100 mL del protector (Nitrasoil-Li-Koproctect) + 300 mL de **TRICHODERMIL SC** y aplicar a 100 Kg de semilla.

TRIGO: Para preinocular hasta 45 días antes de la siembra, realizar una mezcla homogénea de 200 mL del protector (Nitrasoil-Li-Koproctect) + 600 mL de **TRICHODERMIL SC** y aplicar a 100 kg de semilla.

Importante:

- El proceso de inoculación deberá llevarse a cabo en lugares donde no incida la radiación solar directa.
- Para aplicaciones combinadas con productos compatibles seguir el método secuencial seco: aplicar primero los terapéuticos de base química para el tratamiento de semillas, dejar orear y secar, y por último aplicar los fertilizantes biológicos conjuntamente con **TRICHODERMIL SC**.
- Realizar la calibración de la sembradora con la semilla tratada.

RECOMENDACIONES DE USO:

CULTIVO	Enfermedades controladas	DOSIS cada 100 Kg de semilla
SOJA (*)	<i>Cercospora kikuchii</i> <i>Phoma</i> spp <i>Fusarium spp</i> <i>Rhizoctonia spp</i> <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> <i>Macrophoma phaseolina</i>	300 mL
TRIGO (*)	<i>Fusarium graminearum</i> <i>Drechslera tritici repentis</i> <i>Bipolaris sorokiniana</i> "Carbón Cubierto" <i>Tilletia laevis</i> "Carbón Desnudo" <i>Ustilago tritici</i> <i>Rhizoctonia spp</i>	600 mL

*En tratamientos de semillas utilizar un protector biológico (Nitrasoil-Li-Koproctect), para proporcionar el color a la semilla y aumentar la eficacia del producto.

RESTRICCIONES PARA EL USO:

Periodo de carencia: **TRICHODERMIL SC** se halla exento de periodo de carencia para el uso como terapéutico para tratamiento de semillas. En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberá conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el periodo de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.

COMPATIBILIDAD:

TRICHODERMIL SC es compatible con la mayoría de los productos biológicos y fungicidas aplicables a las semillas.

FITOTOXICIDAD:

No se han manifestado síntomas de fitotoxicidad, respetando las dosis y siguiendo las recomendaciones que figuran en esta etiqueta.

AVISO DE CONSULTA TÉCNICA: "CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

GARANTÍA:

Este producto se elabora según estrictas normas de calidad. El fabricante sólo es responsable de las características físico-químicas de este producto. Al no ejercer control técnico de su almacenamiento y la aplicación, no se hace responsable por daños y perjuicios que deriven del uso distinto al indicado en esta etiqueta.

REV00-2507-ART.40588.5L



CUIDADO